

Les fraisiers de la Sarthe

- LA CULTURE DE FRAISIERS EN GODETS -

I – GENERALITES

Les fraisiers frigo destinés à la culture en godets sont multipliés en pépinière de plein air et arrachés uniquement en repos végétatif (décembre, janvier, février).

Ils sont ensuite triés, nettoyés, mis en botte de 25 plants et entreposés dans des caissettes de 750 ou 500 plants en chambre froide à -2°C, donc gelés.

Nous nous efforçons de produire des plants de taille convenable pour planter en godets :

- pas trop gros pour pouvoir les planter correctement en godets de 7 ,
- pas trop petit pour avoir un développement rapide et correct de la plante.

La période de plantation idéale débute à partir de la 1^{ère} semaine de janvier. Des problèmes de botrytis (pourriture du collet) peuvent se développer avant cette période lié à :

- une plantation en période de jours courts
- l'aération difficile pour faire sécher correctement les cœurs
- l'ensoleillement insuffisant pour un bon développement de la plante.

II – QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE CULTURE

1 - Dès réception de vos plants

- ↪ Si vous recevez une palette, ne **laissez surtout pas le film plastique qui l'entoure**.
- ↪ Le repotage immédiat est, bien sûr, la solution idéale. Néanmoins, il est possible de conserver vos fraisiers 3 ou 4 jours **dans un endroit frais à l'abri du soleil et du vent** : ceux-ci craignent surtout le dessèchement

2 - Le repotage

- ↪ Comme pour toute autre plante cultivée en godet, un terreau universel classique peut être utilisé.
- ↪ Il est vivement conseillé de couper les racines des plants à 4 ou 5 cm du collet pour obtenir une meilleure reprise en godets de 7 ou autres :
 - Ne pas couper trop long car la racine serait en double dans le godet.
 - Ne pas couper trop court car le collet risquerait d'être endommagé.

Voir notre site internet, www.godefroy-bourneuf.fr, menu 'nos valeurs ajoutées', rubrique 'notre conseil'

- ↪ Enfoncer le plant dans le terreau au niveau du collet sans le recouvrir et bien tasser autour des racines.

3 - Mise en serre ou tunnel

- ↪ Placer vos barquettes dans votre serre à votre convenance. Néanmoins, **distancez-les** pour éviter l'étiollement de vos fraisiers.
- ↪ **Arroser judicieusement** en fonction du climat pour assurer une bonne reprise : le terreau doit rester humide en permanence pendant les 10 premiers jours.
- ↪ **En période humide, bien aérer** pour permettre au collet du fraisier de sécher : la cause principale de non reprise est due à l'implantation d'une pourriture du collet.

4 - Les traitements possibles

- ⇒ Après le 1^{er} arrosage, il est conseillé de réaliser un traitement fongicide pour éviter la pourriture du collet. Ce dernier peut être renouvelé selon les conditions climatiques (humidité des cœurs)
- ⇒ Si le besoin s'en fait sentir, il est possible de fertiliser les fraisiers soit en pulvérisation foliaire, soit dans l'eau d'irrigation. Une autre solution est envisageable par un apport de nitrate de potasse **GRANULES** (ne pas utiliser de poudre car elle risque de brûler le cœur des fraisiers), **à condition d'arroser de suite pour éviter toute brûlure.**

III – PERIODE DE PLANTATION POUR UNE CULTURE DE FRAISIER GODET

1 – Pour le printemps

Pour une vente début mars :

- repotage vers le 10 janvier en tunnel froid (selon conditions climatiques)
- si serre chauffée : délai de culture plus court, à moduler selon la température.

2 – Pour l'automne

Pour une vente vers le 10 septembre :

- repotage vers le 15 août en culture de plein air

* * * * *

Pour la suite de la culture et jusqu'à la vente de votre produit, vos compétences d'horticulteur seront largement suffisantes pour la réussite de vos fraisiers en godets.

Nous restons, cependant, à votre disposition pour tout autre renseignement.



Les fraisiers de la Sarthe

E.A.R.L. GODEFROY-BOURNEUF

La Gilberdière

72200 CROSMIERES

Tél : 02.43.45.83.63 – fax : 02.43.45.38.11

e.mail : godefroy.bourneuf@orange.fr

www.godefroy-bourneuf.fr